



An alle
Kliniken, Institute und
Klinische Abteilungen
des Allgemeinen Krankenhauses

Medizinische Universität Wien
Klinisches Institut für Labormedizin

**Klinische Abteilung für Klinische
Mikrobiologie**

Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien
T: +43 (0)1 40400-51560
helga.kalser@meduniwien.ac.at
www.meduniwien.ac.at

Tit.Ao.Univ. Prof. Dr. A. M. Hirschl
Abteilungsleiter

Wien, 28.02.2017

Löbliche(s) Abteilung/Klinik/Institut!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir möchten Sie bitten folgendes zu beachten:

1. Bakterielle Breitspektrum PCR aus dem Blut

Aufgrund einer Methodenumstellung sind für diesen Test
mindestens 5ml EDTA-Blut erforderlich.

Grundsätzlich sollte dieser Test nur bei Verdacht auf Erreger, die im
SeptiFast[®] nicht erfasst werden, angefordert werden.

2. TB-Diagnostik: Ziehl Neelsen Färbung

Diese Färbung wird unverändert bei Proben aus dem Respirationstrakt sowie
normalerweise sterilen Körperflüssigkeiten (z.B. Liquor, Punktate, Aszites)
und Gewebeproben durchgeführt.

In Harn- und Stuhlproben sind kommensale nicht-tuberkulöse Mykobakterien
relativ häufig mikroskopisch sichtbar, weshalb die Aussagekraft in Hinblick
auf eine Tuberkulose gering ist. Die Untersuchung wird daher nur bei
dringendem Verdacht auf Nieren- oder Darm-TB und vorheriger Rücksprache
(Kl. 51610) durchgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

A. M. Hirschl